


<p><b>APIE JŪSŲ GYDYMĄ</b></p> <p>Jums buvo skirtas antikoaguliantas Lixiana, kuris skystina kraują ir padeda išvengti kraujo krešulių. Svarbu, kad vartotumėte vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeigu praleidote dozę, pavartokite ją nedelsiant, kitą dieną toliau vartokite preparatą kaip paprastai; tą pačią dieną nevartokite dvigubos skirtos dozės.</li> <li>• Nepradėkite vartoti kitų vaistų (įskaitant parduodamus be recepto), neparatę su gydytoju.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenustokite vartoti Lixiana neparatę su gydytoju, nes tai gali padidinti kraujo krešulio susidarymo riziką.</li> <li>• Prašome perskaityti paciento informacinį lapelį, pateikiamą kiekvienoje Lixiana pakuotėje.</li> </ul>	<p><b>KADA REIKIA KREIPTIS MEDICININĖS PAGALBOS</b></p> <p><b>KRAUJAVIMO RIZIKA</b></p> <p>Vartojant antikoagulantą, pvz., Lixiana, gali padidėti kraujavimo rizika. Todėl svarbu žinoti galimus kraujavimo požymius bei simptomus ir <b>nedelsiant</b> kreiptis į gydytoją, jeigu pasireiškė bent viena iš šių būklių:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kraujosruvos arba kraujavimas po oda;</li> <li>• Kraujas šlapime;</li> <li>• kosėjimas krauju;</li> <li>• vėmimas krauju arba turiniu, kuris atrodo kaip malta kava;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kraujavimas iš nosies arba pjautinės žaizdos, kurių kraujavimo ilgai nepavyksta sustabdyti;</li> <li>• dervos spalvos išmatos;</li> <li>• galvos sukimasis arba staigus galvos skausmas;</li> <li>• nepaaiškinamas nuovargis;</li> <li>• nenormalus kraujavimas iš makšties, įskaitant gausesnį ar ilgesnį kraujavimą menstruacijų metu.</li> </ul> <p>Jeigu Jums pasireiškė bet kokių neįprastų simptomų, kreipkitės į gydytoją.</p>	<p><b>PACIENTO ATMINTINĖ</b></p> <p><b>Lixiana®</b> plėvele dengtos tabletės <b>edoksabanas</b></p> <p>Visada turėkite šią atmintinę su savimi.</p> <p>Pateikite ją savo sveikatos priežiūros specialistui, vaistininkui, chirurgui arba odontologui prieš taikant bet kokį medicininį gydymą ar intervenciją.</p>
--	---	--	--	--

<p><b>PACIENTO INFORMACIJA</b></p> <p>Paciento vardas, pavardė: .....</p> <p>Gimimo data: .....</p> <p>Prireikus neatidėliotinos pagalbos, prašome kreiptis: .....</p> <p>Vardas, pavardė: .....</p> <p>Tel. Nr.: .....</p>	<p><b>GYDYMO INFORMACIJA</b> (Pildo gydytojas)</p> <p>Lixiana skirtas vartoti kartą per parą po ..... mg</p> <p>Gydymas pradėtas: ..... / (MMMM-mm)</p> <p>Kraujo tipas: .....</p> <p>Kiti vaistai / sąlygos: .....</p>	<p><b>PREPARATŲ SKIRIANČIO ASMENS INFORMACIJA</b></p> <p>Prireikus daugiau informacijos arba neatidėliotinos pagalbos, prašome kreiptis: .....</p> <p>Gydytojo vardas, pavardė: .....</p> <p>Tel. Nr., antspaudas: .....</p> <p>Gydytojo parašas: .....</p>	<p><b>INFORMACIJA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lixiana yra geriamasis antikoaguliantas, Xa faktoriaus inhibitorius.</li> <li>• Kai reikalinga invazinė procedūra, reikia nutraukti Lixiana vartojimą iki procedūros likus mažiausiai 24 valandoms ir imtis atitinkamų atsargumo priemonių.</li> <li>• Lixiana gali padidinti kraujavimo riziką. Esant kliniškai reikšmingam kraujavimui, nedelsdami nutraukite gydymą.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krešėjimo tyrimai, pvz., TNS, protrombino laikas (PL) arba aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (aDTL), nėra tinkama Lixiana poveikio vertinimo priemonė. Tačiau kalibruotas antifaktoriaus Xa aktyvumo tyrimas gali padėti priimti klinikiškus sprendimus.</li> </ul> <p>Daugiau informacijos pateikiama preparato charakteristikų santraukoje (PCS).</p> <p> Daiichi-Sankyo</p>
---	---	---	--	--