

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje [www.vvkt.lt](http://www.vvkt.lt) esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu [NepageidaujamaR@vvkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vvkt.lt), taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu [www.vvkt.lt](http://www.vvkt.lt)). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

# Valdoxan®

## BROŠIŪRA PACIENTUI

### REKOMENDACIJOS, KAIP IŠVENGTI ŠALUTINIO POVEIKIO KEPENIMS

Valdoxan gali sukelti šalutinį poveikį, įskaitant Jūsų kepenų funkcijos pokyčius.

Šiose gairėse Jums pateikiamos rekomendacijos, kaip išvengti šalutinio poveikio kepenims, ir patarimai, ką daryti, jeigu gydymo Valdoxan metu pasireiškia toks šalutinis poveikis.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos, kreipkitės į gydytoją.

Valdoxan yra antidepresinio poveikio vaistas padedantis Jums gydyti depresiją.

Norėdami, kad Jūsų sveikata būtų geriausiai rūpinamasi, laikykitės savo gydytojo rekomendacijų, susijusių su gydymu Valdoxan (dozės, gydymo trukmės, būklės stebėjimo suplanuotų vizitų metu, kraujo tyrimų atlikimo).

#### KA DARYTI PRIEŠ VARTOJANT VALDOXAN?

- Pasakykite savo gydytojui, jeigu žinote, kad Jūsų kepenys nepakankamai gerai funkcionuoja: tokiu atveju Valdoxan vartoti negalima.
- Gali būti kitų priežasčių, dėl kurių Valdoxan gali Jums netikti. Pasitarkite su savo gydytoju, jeigu:
  - Jūs kada nors sirgote kepenų ligomis;
  - esate nutukęs ar turite viršsvorio;
  - sergate diabetu;
  - vartojate alkoholį;
  - vartojate kitų vaistų (yra žinoma, kad kai kurie vaistai veikia kepenis).

## KĄ DARYTI, KAD GYDYMO METU IŠVENGTUMĖTE KEPENŲ SUTRIKIMŲ?

### ► Reguliariai atlikite kraujo tyrimus

#### • Kodėl?

Prieš Jums pradėdant gydymą, gydytojas turėtų patikrinti, ar Jūsų kepenys gerai veikia. Gydytojo skirti kraujo tyrimai gydytojui parodys, kaip funkcionuoja Jūsų kepenys, ir padės nuspręsti, ar Jums tinka Valdoxan.

Gydymo Valdoxan metu kai kuriems pacientams gali padidėti kepenų fermentų koncentracija kraujyje. Šių kepenų fermentų koncentracija rodo, ar kepenys funkcionuoja tinkamai, ar ne. Šie rodikliai yra gyvybiškai svarbūs gydytojui, stebinčiam Jūsų gydymą.

#### • Kada?

	Prieš pradėdant gydymą ar padidinus dozę	Maždaug po 3 savaitių	Maždaug po 6 savaitių	Maždaug po 12 savaitių	Maždaug po 24 savaitių
Kraujo tyrimai	✓	✓	✓	✓	✓

Jeigu gydytojas padidina vaisto dozę iki 50 mg, tyrimus būtina pakartoti

Nepamirškite eidami pas gydytoją atsinešti su savimi  
**JŪSŲ KRAUJO TYRIMŲ SKYRIMO PRIMINIMĄ** (žr. kitą puslapį)

Jeigu sužinojote, kad Jūsų kepenų fermentų koncentracija kraujyje gydymo metu padidėjo, nedelsdami apie tai praneškite savo gydytojui.

### ► Budriai stebėkite, ar neatsiranda kepenų sutrikimo požymių

Jeigu pastebite kuriuos nors iš čia išvardytų požymių, gali būti, kad Jūsų kepenų funkcija sutriko:

- Pageltusi oda / skleros;
- patamsėjęs šlapimas;
- šviesos išmatos;
- skausmas viršutinėje dešinėje pilvo dalyje;
- neįprastas nuovargis (ypač susijęs su kitais pirmiau išvardytais simptomais).

► Neatidėliodami kreipkitės į gydytoją; jis gali Jums patarti nutraukti Valdoxan vartojimą.

## JŪSŲ KRAUJO TYRIMŲ PASKYRIMO PRIMINIMAS

### ATMINKITE

Vartojant Valdoxan svarbu reguliariai atlikti kraujo tyrimus.

**TOLIAU PATEIKTA LENTELE PADĖS JUMS SEKTI PASKIRTUS VIZITUS KRAUJO TYRIMAMS ATLIKTI.**

VALDOXAN 25 MG – PIRMOJO PAVARTOJIMO DATA:	
Kepenų fermentų koncentracijos kraujyje tyrimų laikotarpiai	Data
Pirmojo tyrimo data ( <i>pradedant gydymą</i> )	
Antrojo tyrimo data ( <i>maždaug po 3 savaitių</i> )	
Trečiojo tyrimo data ( <i>maždaug po 6 savaitių</i> )	
Ketvirtojo tyrimo data ( <i>maždaug po 3 mėnesių</i> )	
Penktojo tyrimo data ( <i>maždaug po 6 mėnesių</i> )	

Jūsų gydytojas gali nuspręsti, kad kraujo tyrimus reikės kartoti ir vėliau.

DOZĖS PADIDINIMAS IKI 50 MG – PIRMOJO PAVARTOJIMO DATA:	
Kepenų fermentų koncentracijos kraujyje tyrimų laikotarpiai	Data
Tyrimo data, pradėdant vartoti Valdoxan 50 mg	
Antrojo tyrimo data ( <i>maždaug po 3 savaitių</i> )	
Trečiojo tyrimo data ( <i>maždaug po 6 savaitių</i> )	
Ketvirtojo tyrimo data ( <i>maždaug po 3 mėnesių</i> )	
Penktojo tyrimo data ( <i>maždaug po 6 mėnesių</i> )	

Jūsų gydytojas gali nuspręsti, kad kraujo tyrimus reikės kartoti ir vėliau.

Nepamirškite eidami pas gydytoją atsinešti ir šias gaires.

Išsamesnė informacija pateikta Valdoxan pakuotės lapelyje.